

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego głównego antygenu powierzchniowego wirusa HBV (HbsAg) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych zawierająca 20 µg oczyszczonego białkowego antygenu Hbs , przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia, stosowana wg schematu szczepień: 0,1,6 miesięcy i 0, 7, 21 dni, 12 miesięcy - schemat szybkiego uodpornienia (fiolki – 1 ml.).	szt.	200	0	0	0	0
2.	Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego głównego antygenu powierzchniowego wirusa HBV (HbsAg) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych zawierająca 20 µg oczyszczonego białkowego antygenu Hbs , przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia, stosowana wg schematu szczepień: 0 ,1, 6 miesięcy i 0, 7, 21 dni, 12 miesięcy - schemat szybkiego uodpornienia (ampułkostrzykawki – 1 ml.).	szt	30	0	0	0	
3.	Zawiesina do wstrzykiwań w ampulko-strzykawce. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów, do stosowania u osób w wieku od lat 4. Wskazana do biernej ochrony przed krztuścem we wczesnym niemowlęctwie, uzyskiwanej po zaszczepieniu matki w czasie trwania ciąży (1 dawka – 0,5 ml). ADACEL	szt.	30	66,45	1 993,50	8	2 152,98
4.	Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio i haemophilus influenzae typ B zawierająca : toksoid błonicy, toksoid tężcowy , toksoid krztuścowy (PT) hemaglutyninę włókienkową (FHA), pertaktynę (69 kDa-OMP), wirus polio typ 1, inaktywowany wirus polio typ 2, inaktywowany wirus polio typ 3, oczyszczony polisacharyd otoczkowy Hib. Przeznaczona dla dzieci od 2 miesiąca życia w schemacie szczepienia pierwotnego – 3 dawki i dawka uzupełniająca w drugim roku życia (ampulko-strzykawki po 0,5 ml z zawiesiną DTPa –IPV + fiolka z liofilizatem Hib+ 2 igły).	szt.	200	0	0	0	0
5.	Szczepionka skojarzona zawierająca toksoid błonicy, toksoid tężcowy, trzy oczyszczone antygeny krztuśca [toksoid krztuścowy (PT), hemaglutynina włókienkowa (FHA) i pertaktyna] adsorbowane na wodorotlenku glinu, trzy typy inaktywowanego wirusa polio (typ 1, 2, 3) oraz oczyszczony polisacharyd otoczkowy haemophilus influenzae typu B (Hib), związany kowalencyjnie z toksoidem tężcowym, antygen powierzchniowy hepatitis B (ilości 10 mikrogramów).	szt.	350	0	0	0	0

	Szczepionka zawierająca: 1 ampułkostrzykawkę bez igły po 0,5 ml z zawiesiną (DTPa-IPV-HBV) + 1 fiołka z proszkiem (Hib) + 2 igły.						
6.	Adsorbowana szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, polio i haemophilus influenzae typu B zawierająca toksoid błonicy, toksoid tężcowy, toksoid krztuścowy (hemaglutynina włókienkowa) inaktywowane wirusy polio typ 1, 2 i 3 oraz oczyszczony polisacharyd otoczkowy haemophilus influenzae typu B w postaci ampułkostrzykawki z igłą (zawiesina DTPa -IPV + fiołka z liofilizatem HIB). PENTAXIM	szt.	200	106,20	21 240,00	8	22 939,20
7.	Szczepionka przeciw zakażeniom rotawirusowym, zawierająca ludzki rotawirus w postaci zawiesiny doustnej, stosowana w schemacie dwudawkowym – 1 dawka 1,5 ml.	szt.	30	0	0	0	0
8.	Szczepionka przeciw ospie wietrznej do stosowania od 9 miesiąca życia u dzieci i dorosłych, w schemacie dwudawkowym.	szt.	150	0	0	0	0
9.	Szczepionka przeciw zakażeniom pneumokokowym, skoniugowana, 13-walentna; zawiera sacharydy pneumokokowe; serotyp 6B skoniugowany białkiem nośnikiem ORM i adsorbowany na fosforanie glinu. Dawka 0,5 ml.	szt.	400	0	0	0	0
10.	Szczepionka skoniugowana, czterowalentna, przeciwko meningokokom grup A,C,W 135 i Y, do stosowania powyżej 1 roku życia - ampułkostrzykawka 0,5 ml.	szt.	100	0	0	0	0
11.	Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, inaktywowana dla dzieci, w dawce 0,25 ml – zawiesina do wstrzyknięć w ampułkostrzykawce.	szt.	200	0	0	0	0
12.	Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla młodzieży i osób dorosłych, w dawce 0,5 ml – zawiesina do wstrzyknięć domięśniowych w ampułkostrzykawce.	szt.	10	0	0	0	0
13.	Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny krztuśca – toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana. Ampułkostrzykawka po 0,5 ml z zawiesiną, z 2 osobnymi igłami-pudełko po 1 szt. HEXACIMA	szt.	250	132,95	33 237,50	8	35 896,50
14.	Szczepionka do czynnego uodpornienia dzieci od 2 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych przeciw inwazyjnej chorobie meningokokowej wywołanej przez Neisseria meningitidis grupy B. 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml z igłą.	szt.	200	0	0	0	0
15.	Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi – bezkomórkowa, złożona, zawierająca 5 antygenów krztuśca; adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów. 0,5ml zawiesiny do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce z 2 osobnymi igłami – opakowanie po 1. ADACEL	szt.	20	66,45	1 329,00	8	1 435,32
16.	Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, inaktywowana, adsorbowana na wodorotlenku glinu uwodnionym – 0,5 mg, 1 dawka – 1 ml	szt.	20	0	0	0	0

17.	Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różycze – żywa jedna dawka (0,5 ml). Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzyknięć. Liofilizowane komponenty odry, świnki i różyczki. Wskazana po ukończeniu 9 miesiąca życia, młodzieży i osób dorosłych.	szt.	10	0	0	0	0
18.	Czterowalentna szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion), inaktywowana. Wskazana do stosowania u osób od ukończenia 6 miesiąca życia. Opakowanie zbiorcze - 10 ampułko-strzykawk po 0,5 ml z igłą (dwa blistry po 5 ampułko-strzykawk)	op.	250	399,00	99 750,00	8	107 730,00

Warszawa, dnia 16.07.2021r.