

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego głównego antygeny powierzchniowego wirusa HBV (HbsAg) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych zawierająca 20 µg oczyszczonego białkowego antygeny Hbs , przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia, stosowana wg schematu szczepień: 0,1,6 miesięcy i 0, 7, 21 dni, 12 miesięcy - schemat szybkiego uodpornienia (fiolki – 1 ml.). / EUVAX B (DLA DOROSŁ.) ZAW.DO WSTRZ. 20 MCG/ML 1 FIOŁ.A 1ML	szt.	200	43,90	8 780,00	8%	9 482,40
2.	Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego głównego antygeny powierzchniowego wirusa HBV (HbsAg) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych zawierająca 20 µg oczyszczonego białkowego antygeny Hbs , przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia, stosowana wg schematu szczepień: 0 ,1, 6 miesięcy i 0, 7, 21 dni, 12 miesięcy - schemat szybkiego uodpornienia (ampułkostrzykawki – 1 ml.).	szt	30				
3.	Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów, do stosowania u osób w wieku od lat 4. Wskazana do biernej ochrony przed krztuścem we wczesnym niemowlęctwie, uzyskiwanej po zaszczepieniu matki w czasie trwania ciąży (1 dawka – 0,5 ml). / ADACEL ZAW.DO WSTRZ. 1 DAW. (0,5 ML) 1 AMP.-STRZ.A 0,5ML (+2 I	szt.	30	65,90	1 977,00	8%	2 135,16

4.	Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio i haemophilus influenzae typ B zawierająca : toksoid błonicy, toksoid tężcowy , toksoid krztuścowy (PT) hemaglutyninę włókienną (FHA), pertaktynę (69 kDa-OMP), wirus polio typ 1, inaktywowany wirus polio typ 2, inaktywowany wirus polio typ 3, oczyszczony polisacharyd otoczkowy Hib. Przeznaczona dla dzieci od 2 miesiąca życia w schemacie szczepienia pierwotnego – 3 dawki i dawka uzupełniająca w drugim roku życia (ampułko-strzykawki po 0,5 ml z zawiesiną DTPa –IPV + fiolka z liofilizatem Hib+ 2 igły).	szt.	200				
5.	Szczepionka skojarzona zawierająca toksoid błonicy, toksoid tężcowy, trzy oczyszczone antygeny krztuśca [toksoid krztuścowy (PT), hemaglutynina włókienna (FHA) i pertaktyna] adsorbowane na wodorotlenku glinu, trzy typy inaktywowanego wirusa polio (typ 1, 2, 3) oraz oczyszczony polisacharyd otoczkowy haemophilus influenzae typu B (Hib), związany kowalencyjnie z toksoidem tężcowym, antygen powierzchniowy hepatitis B (ilości 10 mikrogramów). Szczepionka zawierająca: 1 ampułkostrzykawkę bez igły po 0,5 ml z zawiesiną (DTPa-IPV-HBV) + 1 fiolka z proszkiem (Hib) + 2 igły.	szt.	350				
6.	Adsorbowana szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, polio i haemophilus influenzae typu B zawierająca toksoid błonicy, toksoid tężcowy, toksoid krztuścowy (hemaglutynina włókienna) inaktywowane wirusy polio typ 1, 2 i 3 oraz oczyszczony polisacharyd otoczkowy haemophilus influenzae typu B w postaci ampułkostrzykawki z igłą (zawiesina DTPa -IPV + fiolka z liofilizatem HIB). / PENTAXIM PR.I ROZP.DO SP.ROZT.DO WSTRZ. - 1 FIOŁ. (+AMP-ST.ZAW.0,5	szt.	200	106,35	21 270,00	8%	22 971,60
7.	Szczepionka przeciw zakażeniom rotawirusowym, zawierająca ludzki rotawirus w postaci zawiesiny doustnej, stosowana w schemacie dwudawkowym – 1 dawka 1,5 ml.	szt.	30				
8.	Szczepionka przeciw ospie wietrznej do stosowania od 9 miesiąca życia u dzieci i dorosłych, w schemacie dwudawkowym.	szt.	150				
9.	Szczepionka przeciw zakażeniom pneumokokowym, skoniugowana, 13-walentna; zawiera sacharydy pneumokokowe; serotyp 6B skoniugowany białkiem nośnikiem ORM i adsorbowany na fosforanie glinu. Dawka 0,5 ml. / PREVENAR 13 SZCZEP. ZAW.DO INJ. - 1 AMP.-STRZ.A 0,5ML (Z IG	szt.	400	218,50	87 400,00	8%	94 392,00
10.	Szczepionka skoniugowana, czterowalentna, przeciwko meningokokom grup A,C,W 135 i Y, do stosowania powyżej 1 roku życia - ampułkostrzykawka 0,5 ml. / NIMENRIX PR.I ROZP.DO SP.ROZT.DO WSTRZ. 0,5 ML/DAW. 1 FIOŁ. (+1AMP.-STRZ+2 IG	szt.	100	128,60	12 860,00	8%	13 888,80

11.	Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, inaktywowana dla dzieci, w dawce 0,25 ml – zawiesina do wstrzyknięć w ampułkostrzykawce. / FSME - IMMUN 0,25ML JUNIOR ROZT.DO WSTRZ. 1,2 MCG/0,25ML 1 AMP.-STRZ.A 0,25ML	szt.	200	69,90	13 980,00	8%	15 098,40
12.	Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla młodzieży i osób dorosłych, w dawce 0,5 ml – zawiesina do wstrzyknięć domięśniowych w ampułkostrzykawce. / FSME -IMMUN 0,5ML ZAW.DO WSTRZ. 2,4 MCG/0,5ML 1 AMP.-STRZ.A 0,5ML (BEZ	szt.	10	76,00	760,00	8%	820,80
13.	Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny krztuśca – toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókiennkową), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana. Ampułko-strzykawka po 0,5 ml z zawiesiną, z 2 osobnymi igłami-pudełko po 1 szt. / HEXACIMA ZAW.DO WSTRZ. 0,5 ML 1 AMP.-STRZ.A 0,5ML (+2 I	szt.	250	133,80	33 450,00	8%	36 126,00
14.	Szczepionka do czynnego uodpornienia dzieci od 2 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych przeciw inwazyjnej chorobie meningokokowej wywołanej przez Neisseria meningitidis grupy B. 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml z igłą.	szt.	200				
15.	Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi – bezkomórkowa, złożona, zawierająca 5 antygenów krztuśca; adsorbowana o zmniejszonej zawartości antygenów. 0,5ml zawiesiny do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce z 2 osobnymi igłami – opakowanie po 1. / ADACEL POLIO ZAW.DO WSTRZ. 1 DAW. (0,5 ML) 1 AMP.-STRZ.A 0,5ML+IGŁA	szt.	20	65,90	1 318,00	8%	1 423,44
16.	Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, inaktywowana, adsorbowana na wodorotlenku glinu uwodnionym – 0,5 mg, 1 dawka – 1 ml / AVAXIM 160 U ZAW.DO INJ.DOM. 160 J.M./0,5ML 1 AMP.-STRZ.A 0,5ML	szt.	20	131,90	2 638,00	8%	2 849,04
17.	Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce – żywa jedna dawka (0,5 ml). Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzyknięć. Liofilizowane komponenty odrzy, świnki i różyczki. Wskazana po ukończeniu 9 miesiąca życia, młodzieży i osób dorosłych.	szt.	10				

18.	Czterowalentna szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion), inaktywowana. Wskazana do stosowania u osób od ukończenia 6 miesiąca życia. Opakowanie zbiorcze - 10 ampułko-strzykawk po 0,5 ml z igłą (dwa blistry po 5 ampułko-strzykawk) / VAXIGRIPTETRA ZAW.DO WSTRZ. 1 DAW. (0,5 ML) 10 AMP.-STRZ.A 0,5ML (Z I	op.	250	409,00	102 250,00	8%	110 430,00
-----	--	-----	------------	--------	-------------------	----	-------------------