

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY  
(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	% VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego głównego antygenu powierzchniowego wirusa HBV (HbsAg) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych zawierająca 20 µg oczyszczonego białkowego antygenu Hbs , przeznaczona dla osób powyżej 15 roku życia, stosowana wg schematu szczepień: 0,1,6 miesięcy i 0, 7, 21 dni, 12 miesięcy - schemat szybkiego uodpornienia (fiolki – 1 ml).	szt.	150				
2.	Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio i haemophilus influenzae typ B zawierająca : toksoid błonicy, toksoid tężcowy , toksoid krztuścowy (PT) hemaglutyninę włókiennkową (FHA), pertaktynę (69 kDa-OMP), wirus polio typ 1, inaktywowany wirus polio typ 2, inaktywowany wirus polio typ 3, oczyszczony polisacharyd otoczkowy Hib. Przeznaczona dla dzieci od 2 miesiąca życia w schemacie szczepienia pierwotnego – 3 dawki i dawka uzupełniająca w drugim roku życia ( ampułkostrzykawki po 0,5 ml z zawiesiną DTPa –IPV + fiołka z liofilizatem Hib+ 2 igły).	szt.	70				
3.	Szczepionka skojarzona zawierająca toksoid błonicy, toksoid tężcowy, trzy oczyszczone antygeny krztuśca [toksoid krztuścowy (PT), hemaglutynina włókiennkowa (FHA) i pertaktyna] adsorbowane na wodorotlenku glinu, trzy typy inaktywowanego wirusa polio (typ 1, 2, 3) oraz oczyszczony polisacharyd otoczkowy haemophilus influenzae typu B (Hib), związany kowalencyjnie z toksoidem tężcowym, antygen powierzchniowy hepatitis B (ilości 10 mikrogramów). Szczepionka zawierająca: 1 ampułkostrzykawkę bez igły po 0,5 ml z zawiesiną (DTPa-IPV-HBV) + 1 fiołka z proszkiem (Hib) + 2 igły.	szt.	150				
4.	Adsorbowana szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, polio i haemophilus influenzae typu B zawierająca toksoid błonicy, toksoid tężcowy, toksoid krztuścowy (hemaglutynina włókiennkowa) inaktywowane wirusy polio typ 1, 2 i 3 oraz oczyszczony polisacharyd otoczkowy haemophilus influenzae typu B w postaci ampułkostrzykawki z igłą (zawiesina DTPa -IPV + fiołka z liofilizatem HIB).	szt.	50	118,06 zł	5 903,00 zł	8%	6 375,24 zł
5.	Szczepionka przeciw zakażeniom rotawirusowym, zawierająca ludzki rotawirus w postaci zawiesiny doustnej, stosowana w schemacie dwudawkowym – 1 dawka 1,5 ml.	szt.	25				

6.	Szczepionka przeciw ospie wietrznej do stosowania od 9 miesiąca życia u dzieci i dorosłych, w schemacie dwudawkowym.	szt.	<b>50</b>				
7.	Szczepionka przeciw zakażeniom pneumokokowym, skoniugowana, 13-walentna; zawiera sacharydy pneumokokowe; serotyp 6B skoniugowany białkiem nośnikiem ORM i adsorbowany na fosforanie glinu. Dawka 0,5 ml.	szt.	<b>300</b>	221,30 zł*	66 390,00 zł	8%	71 701,20 zł
8.	Szczepionka skoniugowana, czterowalentna, przeciwko meningokokom grup A,C,W 135 i Y, do stosowania powyżej 1 roku życia - ampułkostrzykawka 0,5 ml.	szt.	<b>70</b>	164,63 zł	11 524,10 zł	8%	12 446,03 zł
9.	Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkórkowa, złożona, zawierająca dwa antygeny krztuśca – toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienną), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana. Ampułko-strzykawka po 0,5 ml z zawiesiną, z 2 osobnymi igłami-pudełko po 1 szt.	szt.	<b>150</b>	145,83	21 874,50 zł	8%	23 624,46 zł
10.	Szczepionka do czynnego uodpornienia dzieci od 2 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych przeciw inwazyjnej chorobie meningokokowej wywołanej przez Neisseria meningitidis grupy B. 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml z igłą.	szt.	<b>150</b>				
11.	Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce – żywa jedna dawka (0,5 ml). Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzyknięć. Liofilizowane komponenty odry, świnki i różyczki. Wskazana po ukończeniu 9 miesiąca życia, młodzieży i osób dorosłych.	szt.	<b>5</b>				
12.	Czterowalentna szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion), inaktywowana. Wskazana do stosowania u osób od ukończenia 6 miesiąca życia. Opakowanie zbiorcze - 10 ampułko-strzykawek po 0,5 ml z igłą (dwa blistry po 5 ampułko-strzykawek)	op.	<b>200</b>				

**\*- cena za dawkę, opakowanie handlowe x 10 dawek**