




KALENDARZE SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH

Więcej informacji o szczepieniach
zalecanych osobom dorosłym



Zapytaj lekarza o szczepienia
zalecane w Twoim wieku.

KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH
WSZYSCY DOROŚLI W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU





KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROŚŁYCH WSZYSCY DOROŚLI W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU

szczepienia  info

SZCZEPIONKA PRZECIW	WIEK (LATA)				
	19 - 26	27 - 49	50 - 59	60 - 64	>65
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)*				
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat				
Ospie wietrznej (VZV)	2 dawki (osoby, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie były szczepione)				
Odrze, śwince, różyczce (MMR)	2 dawki (osoby, które nie chorowały na odrę lub różyczkę i nie były szczepione)				
Covid-19	Szczepienie wg aktualnych zaleceń				
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	3 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione)				
Ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)	3 dawki	3 dawki (decyzja o szczepieniu po rozmowie z lekarzem na temat korzyści ze szczepienia)			
Pneumokokom (PCV, PPSV)			1 dawka PCV-13 lub PCV-20	1 dawka PCV-13 lub PCV-20	1 dawka PCV-13 + PPSV-23 lub 1 dawka PCV-20
Półpaścowi (RZV)			2 dawki w odstępie 2 - 6 miesięcy		
Syncyjalnemu wirusowi oddechowemu (RSV)				1 dawka	
Kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM)	3 dawki + dawki przypominające co 3-5 lat				
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV)	2 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione)				
Meningokokom (MenB, MenACWY)	1 lub 2 dawki				

*dla osób w wieku ≥ 60 lat szczepionką zalecaną jest szczepionka wysokodawkowa, w przypadku jej niedostępności lub braku akceptacji przez pacjenta – szczepionka standardowa.

■ szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych osób w tym wieku

■ szczepienia zalecane, gdy występują dodatkowe czynniki ryzyka (np. medyczne, zawodowe, związane ze stylem życia)

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; VZV - szczepionka przeciw ospie wietrznej; MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; HPV - szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; RZV - szczepionka przeciw półpaścowi; RSV - szczepionka przeciw syncyjalnemu wirusowi oddechowemu; KZM - szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu; HAV (Hepatitis A Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A; MenB - szczepionka przeciw meningokokom grupy B; MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W, Y.




KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH

SZCZEPIENIA SZCZEGÓLNIIE WAŻNE DLA OSÓB STARSZYCH

**Zapytaj lekarza o szczepienia
zalecane w Twoim wieku.**



**Więcej informacji o szczepieniach
zalecanych osobom starszym**



Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025,
finansowane przez Ministra Zdrowia.



KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH OSOBY STARSZE

szczepienia  info

SZCZEPIONKA PRZECIWIW	WIEK (LATA)		
	50-59	60-64	>65
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)*		
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat		
Covid-19	Szczepienie wg aktualnych zaleceń		
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	3 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione)		
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 lub PCV-20	1 dawka PCV-13 lub PCV-20	1 dawka PCV-13 + PPSV-23 lub 1 dawka PCV-20
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy		
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka		
Kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM)	3 dawki + dawki przypominające co 3-5 lat		
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV)	2 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione)		
Meningokokom (MenB, MenACWY)	MenB- 2 dawki, MenACWY- 1 dawka		

*dla osób w wieku ≥ 60 lat szczepionką zalecaną jest szczepionka wysokodawkowa, w przypadku jej niedostępności lub braku akceptacji przez pacjenta - szczepionka standardowa.

- szczepienia zalecane dla wszystkich nieudpornionych osób w tym wieku
- szczepienia zalecane, gdy występują dodatkowe czynniki ryzyka (np. medyczne, zawodowe, związane ze stylem życia)

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; RZV - szczepionka przeciw półpaścowi; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu; KZM - szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu; HAV (Hepatitis A Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A; MenB - szczepionka przeciw meningokokom grupy B; MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W, Y lub C.




KALENDARZ SZCZEPIEŃ
Kobiet Planujących Ciążę
ORAZ Kobiet w Ciąży

Jesteś w ciąży?

**Zapytaj lekarza o szczepienia
zalecane dla Ciebie.**

**Więcej informacji o szczepieniach
zalecanych kobietom w ciąży**





KALENDARZ SZCZEPIEŃ Kobiet PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ ORAZ Kobiet W CIĄŻY

szczepienia  info

KALENDARZ SZCZEPIEŃ KobiET PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

SZCZEPIONKA PRZECIWIW	OKRES PRZED CIĄŻĄ
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	3 dawki (kobiety, które nie były wcześniej szczepione)
Ospie wietrznej (VZV)*	2 dawki (kobiety, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie były szczepione)
Odrze, śwince, różyczce (MMR)*	1 lub 2 dawki (kobiety, które nie chorowały na różyczkę i nie były szczepione)
Grypie (IIV)	1 dawka w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)

KALENDARZ SZCZEPIEŃ KobiET W CIĄŻY

SZCZEPIONKA PRZECIWIW	OKRES CIĄŻY
Grypie (IIV)	1 dawka, może być podana w każdym okresie ciąży
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka w każdej ciąży, może być podana między 27. a 36 tc. (optymalnie między 28 a 32 tc.)
Covid-19	Szczepienie wg aktualnych zaleceń
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka, może być podana między 24. a 36. tc. (optymalnie między 32 a 36 tc.).

*szczepienie zakończone nie później niż miesiąc przed zajściem w ciążę.

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z obniżoną zawartością składnika błonicy i krztuśca; Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu; HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; VZV - szczepionka przeciw ospie wietrznej; MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce

**Więcej informacji o szczepieniach zalecanych
osobom z chorobami układu oddechowego**



**Masz chorobę układu oddechowego?
Zapytaj lekarza o szczepienia
zalecane dla Ciebie.**

**KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH
SZCZEPIENIA SZCZEGÓLNIE WAŻNE DLA
PACJENTÓW Z CHOROBAAMI UKŁADU ODDECHOWEGO**





KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH PACJENCI Z CHOROBYMI UKŁADU ODDECHOWEGO

szczepienia  info

SZCZEPIONKA PRZECIWIW	SCHEMAT SZCZEPIENIA
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)*
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 + PPSV-23 (z zachowaniem odstępu ≥ 8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat
Covid-19	Szczepienie wg aktualnych zaleceń
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka u osób w wieku ≥ 60 lat
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy

*dla osób w wieku ≥ 60 lat szczepionką zalecaną jest szczepionka wysokodawkowa, w przypadku jej niedostępności lub braku akceptacji przez pacjenta – szczepionka standardowa.

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu; RZV - szczepionka przeciw półpaścowi.

Osoby starsze w wieku ≥ 65 lat są szczepione wg Kalendarza Szczepień osób starszych
Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.

**KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH
SZCZEPIENIA SZCZEGÓLNIE WAŻNE DLA
PACJENTÓW Z CHOROBAAMI UKŁADU
SERCOWO-NACZYNIOWEGO**




**Masz chorobę kardjologiczną?
Zapytaj lekarza o szczepienia
zalecane dla Ciebie.**



**Więcej informacji o szczepieniach zalecanych
osobom z chorobami kardjologicznymi!**

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025,
finansowane przez Ministra Zdrowia.





KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH PACJENCI Z CHOROBYMI UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

szczepienia  info

SZCZEPIONKA PRZECIW	SCHEMAT SZCZEPIENIA
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)*
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 + PPSV-23 (z zachowaniem odstępu ≥ 8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat
Covid-19	Szczepienie wg aktualnych zaleceń
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka u osób w wieku ≥ 60 lat
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy

*dla osób w wieku ≥ 60 lat szczepionką zalecaną jest szczepionka wysokodawkowa, w przypadku jej niedostępności lub braku akceptacji przez pacjenta – szczepionka standardowa.

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu; RZV - szczepionka przeciw półpaścowi.

Osoby starsze w wieku ≥ 65 lat są szczepione wg Kalendarza Szczepień osób starszych.

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.



KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH SZCZEPIENIA SZCZEGÓLNE WAŻNE DLA PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBAŃ NEREK

**Masz przewlekłą chorobę nerek?
Zapytaj lekarza o szczepienia
zalecane dla Ciebie.**



**Więcej informacji o szczepieniach zalecanych
osobom z przewlekłą chorobą nerek** ←



KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH PACJENCI Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBAŃ NEREK

szczepienia info

SZCZEPIONKA PRZECIW	SCHEMAT SZCZEPIENIA
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	4 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione), dodatkowo ocena odporności poszczepiennej
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)*
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 (w odstępie ≥ 8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat
Covid-19	Szczepienie wg aktualnych zaleceń
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka (u osób w wieku ≥ 60 lat)

*dla osób w wieku ≥ 60 lat szczepionką zalecaną jest szczepionka wysokodawkowa, w przypadku jej niedostępności lub braku akceptacji przez pacjenta – szczepionka standardowa.

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV – polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; HBV (Hepatis B Vaccine) - szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z obniżoną zawartością antygenów błonicy i krztuśca; Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; VZV - szczepionka przeciw ospie wietrznej; MMR- szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; RZV- szczepionka przeciw półpaścowi; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu.

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.

**KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH
SZCZEPIENIA SZCZEGÓLNIE WAŻNE DLA
PACJENTÓW Z PRZEWLĘKĄ CHOROBA WĄTRÓBY**




**Masz przewlekłą chorobę wątroby?
Zapytaj lekarza o szczepienia
zalecane dla Ciebie.**



**Więcej informacji o szczepieniach zalecanych
osobom z przewlekłą chorobą wątroby**

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025,
finansowane przez Ministra Zdrowia.





KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH PACJENCI Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBA WĄTROBY

szczepienia  info

SZCZEPIONKA PRZECIW	SCHEMAT SZCZEPIENIA
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B* (HBV)	3 dawki w schemacie 0, 1, 6 miesięcy
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV)	2 dawki w odstępie 6-12 miesięcy
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)**
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 (w odstępie ≥ 8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym)
COVID-19	Szczepienie wg aktualnych zaleceń
Meningokokom (MenB, MenACWY)	MenB 2 dawki w odstępie 1 miesiąca (Bexsero) 2 dawki w odstępie 6 miesięcy lub 3 dawki w schemacie 0, 1, 4 miesiące (Trumenba) MenACWY - 1 dawka
Ospie wietrznej	2 dawki w odstępie ≥ 6 tygodni (u osób, które nie chorowały na ospę wietrzną)
Odrze, śwince, różyczce (MMR)	2 dawki (u osób, które nie chorowały na odrę lub różyczkę i nie były szczepione)
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka (u osób w wieku ≥ 60 lat)


*dla osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C szczepionki obowiązkowe, bezpłatne, dostępne za pośrednictwem stacji sanitarno-epidemiologicznych (tak jak w przypadku innych szczepień obowiązkowych); osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu B nie wymagają szczepienia

**dla osób w wieku ≥ 60 lat szczepionką zalecaną jest szczepionka wysokodawkowa, w przypadku jej niedostępności lub braku akceptacji przez pacjenta - szczepionka standardowa.

HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; HAV (Hepatitis A Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A; IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; MenB - szczepionka przeciw meningokokom serogrupy B; MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom serogrupy A, C, W135, Y; VZV - szczepionka przeciw ospie wietrznej; MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; RZV - szczepionka przeciw półpaścowi; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.

Więcej informacji o szczepieniach zalecanych
osobom z cukrzycą



Chorujesz na cukrzycę?
Zapytaj lekarza o szczepienia
zalecane dla Ciebie.

KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH
SZCZEPIENIA SZCZEGÓLNIE WAŻNE
DLA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ





KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH PACJENCI Z CUKRZYCĄ

szczepienia  info

SZCZEPIONKA PRZECIW	SCHEMAT SZCZEPIENIA
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)*
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 (w odstępie ≥ 8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	3 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione), dodatkowo ocena odporności poszczepiennej
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat
Covid-19	Szczepienie wg aktualnych zaleceń
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka, osoby w wieku ≥ 60 lat
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2 - 6 miesięcy

*dla osób w wieku ≥ 60 lat szczepionką zalecaną jest szczepionka wysokodawkowa, w przypadku jej niedostępności lub braku akceptacji przez pacjenta - szczepionka standardowa.

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z obniżoną zawartością antygenów błonicy i krztuśca; Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu; RZV - szczepionka przeciw półpaścowi

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.

**KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH
SZCZEPIENIA SZCZEGÓLNE WAŻNE DLA
PACJENTÓW Z ASPLENIĄ LUB DYSFUNKCJĄ ŚLEDZIONY**



Masz asplenię lub dysfunkcję śledziony? Zapytaj lekarza o szczepienia zalecane dla Ciebie.



**Więcej informacji o szczepieniach zalecanych
osobom z asplenią lub dysfunkcją śledziony**



KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH PACJENCI Z ASPLENIĄ LUB DYSFUNKCJĄ ŚLEDZIONY

szczepienia  info

SZCZEPIONKA PRZECIW	SCHEMAT SZCZEPIENIA
Pneumokokom (PCV, PPSV)*	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 (w odstępie ≥ 8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20
Meningokokom (MenB, MenACWY)*	MenB 2 dawki w odstępie 1 miesiąca (Bexero) 3 dawki: 2. dawka po miesiącu po dawce 1., 3. dawka po 4 miesiącach po dawce 2. (Trumenba) dawki przypominające: pierwsza po roku od szczepienia podstawowego, kolejne co 2-3 lata
Zakażeniu <i>Haemophilus influenzae</i> typu b (Hib)*	MenACWY - 2 dawki w odstępie 8 tygodni, dawki przypominające co 5 lat 1 dawka
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)*	1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym)
Odrze, śwince, różyczce (MMR)*	2 dawki (osoba, która nie chorowała na odrę lub różyczkę i nie była szczepiona)
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)*	3 dawki (osoba, która nie była wcześniej szczepiona)
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)**
Covid-19	Szczepienie wg aktualnych zaleceń
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2 - 6 miesięcy

*szczepionki obowiązkowe, bezpłatne, dostępne (bez względu na wiek) za pośrednictwem stacji sanitarno-epidemiologicznych (tak jak w przypadku innych szczepień obowiązkowych). Szczepienia są wykonywane zgodnie ze schematem ustalonym indywidualnie przez lekarza.

**dla osób w wieku ≥ 60 lat szczepionką zalecaną jest szczepionka wysokodawkowa, w przypadku jej niedostępności lub braku akceptacji przez pacjenta - szczepionka standardowa.

PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; MenB - szczepionka przeciw meningokokom grupy B; MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W135, Y; Hib - szczepionka przeciw *Haemophilus influenzae* typu b; IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; RZV - szczepionka przeciw półpaścowi

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.

Więcej informacji o szczepieniach zalecanych
pacjentom z chorobami reumatycznymi!



Masz chorobę reumatyczną?
Zapytaj lekarza o szczepienia
zalecane dla Ciebie.

**KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH
SZCZEPIENIA SZCZEGÓLNIE WAŻNE DLA
PACJENTÓW Z CHOROBAМИ REUMATYCZNYMI
I MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYMI**





KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH PACJENCI Z CHOROBYMI REUMATYCZNYMI I MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWYMI

szczepienia  info

SZCZEPIONKA PRZECIW	SCHEMAT SZCZEPIENIA
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)*
Covid-19	Szczepienie wg aktualnych zaleceń
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym)
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 (w odstępie ≥ 8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20
HPV (HPV-2, HPV-9)	3 dawki w schemacie 0, 1, 6 (HPV-2); 0, 2, 6 miesięcy (HPV-9)
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	3 dawki w schemacie 0, 1, 6 miesięcy, dodatkowo oznaczanie przeciwciał
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV)	2 dawki w odstępie 6-12 miesięcy
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka (u osób w wieku ≥ 60 lat)

*dla osób w wieku ≥ 60 lat szczepionką zalecaną jest szczepionka wysokodawkowa, w przypadku jej niedostępności lub braku akceptacji przez pacjenta – szczepionka standardowa.

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; HPV-2 - szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka 2-walentna; HPV-9 -szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka 9-walentna; HBV- szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, HAV- szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, RZV- szczepionka przeciw półpaścowi; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu.

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.

**Więcej informacji o szczepieniach zalecanych
pacjentom z chorobą związaną
z zaburzeniami odporności**



**Masz zaburzenia odporności?
Zapytaj lekarza o szczepienia
zalecane dla Ciebie.**



**KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH
SZCZEPIENIA SZCZEGÓLNIE WAŻNE DLA
PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI ODPORNOŚCI**



KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH PACJENCI Z ZABURZENIAMI ODPORNOŚCI* (Z WYŁĄCZENIEM PACJENTÓW ZAKAŻONYCH HIV)

szczepienia  info

SZCZEPIONKA PRZECIW	SCHEMAT SZCZEPIENIA
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)**
Covid-19	Szczepienie wg aktualnych zaleceń
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym)
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 (w odstępie ≥ 8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20
Meningokokom (MenB, MenACWY)	MenB - 2 dawki w odstępie 1 miesiąca (Bexsero) 2 dawki w odstępie 6 miesięcy lub 3 dawki w schemacie 0, 1, 4 miesiące (Trumenba); dawka przypominająca po roku oraz kolejne co 2-3 lata MenACWY - 2 dawki; co 5 lat dawka przypominająca
HPV (HPV-2, HPV-9)	3 dawki w schemacie 0, 1, 6 (HPV-2); 0, 2, 6 miesięcy (HPV-9)
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	3 dawki w schemacie 0, 1, 6 miesięcy, dodatkowo oznaczanie przeciwciał
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV)	2 dawki w odstępie 6-12 miesięcy
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka (u osób w wieku ≥ 60 lat)

*zalecenia dotyczą pacjentów z umiarkowanym i ciężkim pierwotnym lub wtórnym niedoborem odporności.

**dla osób w wieku ≥ 60 lat szczepionką zalecaną jest szczepionka wysokodawkowa, w przypadku jej niedostępności lub braku akceptacji przez pacjenta – szczepionka standardowa.

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV – polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; MenB - szczepionka przeciw meningokokom serogrupy B; MenACWY – szczepionka przeciw meningokokom serogrupy A, C, W135, Y; HPV-2 - szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka 2-walentna; HPV-9 - szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka 9-walentna; MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; RZV - szczepionka przeciw półpaścowi; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu.

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.

**KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH
SZCZEPIENIA SZCZEGÓLNIE WAŻNE DLA
PACJENTÓW Z ZAKAŻONYCH HIV**



**Jesteś zakażony HIV?
Zapytaj lekarza o szczepienia
zalecane dla Ciebie.**



**Więcej informacji o szczepieniach
zalecanych pacjentom zakażonym HIV**



KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH PACJENCI ZAKAŻENI HIV

szczepienia info

SZCZEPIONKA PRZECIW	SCHEMAT SZCZEPIENIA
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)*
Covid-19	Szczepienie wg aktualnych zaleceń
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym)
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 (w odstępie ≥ 8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20
Meningokokom (MenB, MenACWY)	MenB 2 dawki w odstępie 1 miesiąca (Bexsero) 2 dawki w odstępie 6 miesięcy lub 3 dawki w schemacie 0, 1, 4 miesiące (Trumenba)
	MenACWY 1 dawka; co 5 lat dawka przypominająca
HPV (HPV-2, HPV-9)**	3 dawki w schemacie 0, 1, 6 (HPV-2); 0, 2, 6 miesięcy (HPV-9)
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)**	3 dawki w schemacie 0, 1, 6 miesięcy
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV)**	2 dawki w odstępie 6-12 miesięcy
Odrze, śwince, różyczce (MMR)***	2 dawki w odstępie ≥ 4 tygodni (u osób, które nie chorowały na odrę lub różyczkę i nie były szczepione)
Ospie wietrznej (VZV)***	2 dawki w odstępie ≥ 6 tygodni (u osób, które nie chorowały na ospę wietrzną)
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka (u osób w wieku ≥ 60 lat)

*dla osób w wieku ≥ 60 lat szczepionką zalecaną jest szczepionka wysokodawkowa, w przypadku jej niedostępności lub braku akceptacji przez pacjenta – szczepionka standardowa.

**jeśli to możliwe, szczepienie powinno być wykonane przy liczbie CD4 >200 kom/ μ l.

***szczepienie przeciwwskazane, jeśli liczba CD4 wynosi <200 kom/ μ l.

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; MenB - szczepionka przeciw meningokokom serogrupy B; MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom serogrupy A, C, W135, Y; HPV-2 - szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka 2-walentna; HPV-9 - szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka 9-walentna; MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; RZV - szczepionka przeciw półpaścowi; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu.

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.

Więcej informacji o szczepieniach
zalecanych osobom planującym podróż



Planujesz podróż?
Zapytaj lekarza o szczepienia
zalecane dla Ciebie.

KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH
SZCZEPIENIA WAŻNE W MEDYCYNIE PODRÓŻY





KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH

MEDYCYNA PODRÓŻY

szczepienia 

SZCZEPIONKA PRZECIW	WIEK (LATA)		
	19 - 49	50 - 65	≥ 65
Grypie (IIV)	1 dawka co roku		
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym) 3 dawki w schemacie 0,1,6 miesięcy (osoba wcześniej nieszczepiona)		
Odrze (MMR)	2 dawki w odstępie ≥4 tygodni (u osób, które nie chorowały na odrę i nie były szczepione)		
Covid-19	Szczepienie wg aktualnych zaleceń		
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B	3 dawki (osoby wcześniej nieszczepione)		
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 lub PCV-20	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 lub 1 dawka PCV-20	
Kleszczowemu zapaleniu mózgu	3 dawki + dawki przypominające co 3-5 lat (osoby, które nie chorowały i nie były szczepione)		
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A	2 dawki (osoby, które nie chorowały i nie były szczepione)		
Meningokokom (MenACWY)	1 dawka		
Żółtej gorączce	1 dawka		
Durowi brzuszemu	1 dawka (szczepionka inaktywowana) lub 3 dawki (szczepionka żywa)		
Cholera	2 dawki (szczepionka inaktywowana) lub 1 dawka (szczepionka żywa)		
Japońskiemu zapaleniu mózgu	2 dawki		
Wścieklicznie	2 lub 3 dawki		

- szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych osób w tym wieku
- szczepienia zalecane podróżnym w zależności od celu podróży

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom serogrupy A, C, W135, Y

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.


**KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH
SZCZEPIENIA SZCZEGÓLNIIE WAŻNE DLA
PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA**



**Jesteś pracownikiem medycznym?
Zapytaj lekarza o szczepienia
zalecane dla Ciebie.**



**Więcej informacji o szczepieniach
zalecanych pracownikom ochrony zdrowia**





KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA

szczepienia  info

SZCZEPIONKA PRZECIW	SCHEMAT SZCZEPIENIA
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	3 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione)
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu)
Covid-19	Szczepienie wg aktualnych zaleceń
Odrze, śwince, różyczce (MMR)	2 dawki (osoby, które nie chorowały na odrę lub różyczkę i nie były szczepione)
Ospie wietrznej (VZV)	2 dawki (osoby, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie były szczepione)
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat
Meningokoki (MenB, MenACWY)	1 lub 2 dawki

HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; wszyscy nieszczepieni powinni dostać 3 dawki szczepionki w schemacie 0-1-6 miesięcy, u osób z grup ryzyka zakażenia zaleca się oznaczenie stężenia przeciwciał anti-HBs nie wcześniej niż 4 tygodnie po podaniu ostatniej dawki; szczepienie bezpłatne.

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; dostępna w ramach refundacji w aptece (50% lub 100%).

Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; szczepienie bezpłatne.

MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; u osób nieuodpornionych 2 dawki w odstępie 4 tyg.; szczepionka odpłatna.

VZV - szczepionka przeciw ospie wietrznej; u osób nieuodpornionych 2 dawki; szczepionka odpłatna.


Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; zalecane jest podanie pojedynczej dawki przypominającej co 10 lat; szczepionka odpłatna.

MenB, MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom grupy B oraz szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W135, Y; zalecane 2 dawki szczepionki MenB w odstępie 4 tyg. oraz 1 dawka MenACWY; szczepionki odpłatne.

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.

ZAPRASZAMY DO POBRANIA





ZAPRASZAMY DO POBRANIA