

16	Paskowy test na oxydazę	1200									
17	Paskowy test na PYR	600									
	Odczynnik PYR										
18	Test paskowy z nitrocefiną do wykrywania B-laktamaz	90									
19	Test antygenowy Sars Cov-2 z wymazu z nosogardzieli. Metoda kasetkowa immunochromatograficzna. W zestawie: wymazówki do poboru z nosogardzieli , kontrola dodatnia i ujemna gotowa do użycia w postaci wymazówek. Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza laboratoryjnym - Bufor inaktywujący wirusa po ok. 10 min. Test musi spełniać aktualne wymagania refundacji przez NFZ oraz musi znajdować się na liście testów, których wyniki są wzajemnie uznawane w krajach UE. Test musi posiadać status WHO EUL. Brak reaktywności krzyżowej z koronawirusem HKU1, NL63, OC43, 229E i MERS. Brak wpływu mutacji Omikron, Delta, Mu na wynik testu.	1000									
20	Zestaw z gotowymi do użycia odczynnikami do wykrywania karbapenemaz klasy A, B i D u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp.,	190									
21	Wymazówka z drewna, wacik bawełniany o średnicy 5 mm, dł. całkowita 150mm, dł. użytkowa 140mm, sterylne – R, pak. Indywidualnie	21000									
22	Wymazówka z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, podłoże AMIES, w próbówce transportowej o śr min. 13 mm, sterylne, pak. Indywidualnie. Udokumentowana przeżywalność szczepów wzorcowych w okresie 72 godz. w temp pokojowej i lodówkowej, , klasa IIa	22800									
23	Wymazówka z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, podłoże AMIES z węglem, w próbówce transportowej o śr min. 13 mm, sterylne, pak. indywidualnie. Udokumentowana przeżywalność szczepów wzorcowych w okresie 72 godz. w temp pokojowej i lodówkowej, klasa IIa	1500									
24	Ezy1µl, zakończone igłą, sterylne, pakowane po 20 szt., dokument potwierdzający pojemność ez.	150000									
25	Ezy10µl, zakończone igłą, sterylne., pakowane po 20 szt., dokument potwierdzający pojemność ez.	12000									
26	Test kasetkowy do jednoczesnego oznaczania SARS COV2/ GRYPA A+B/ RSV .Możliwość stosowania w środowisku laboratoryjnym i poza laboratoryjnym	11865									
27	Test paskowy od wykrywania esterazy octanowej 50ozn.	150									
28	Test kasetkowy do wykrywania antygenu Streptococcus pyogenes w wymazach z gardła	1500									
29	Test paskowy do różnicowania Moraxella i Neisseria	150									
30	Krażki do różnicowania szczepów Haemophilus V	360									
31	Krażki do różnicowania szczepów Haemophilus XV	450									
32	Krażki do różnicowania szczepów Haemophilus X	270									
33	Wankomycyna 0.25-16mg/l MIC ,metoda mikrorozcieńczeń w bulionie, stabilność po otwarciu min. 14 dni, reakcje barwne wraz z nośnikiem	260									
34	Kontrole do oferowanych testów wg zaleceń producentów testów(wypełnić):										

SUMA

		TAK/NIE
35	Labquality dla Legionella pneumophila -wykrywanie antygenu w moczu 1 raz w roku na koszt oferenta	
36	Oferent zapewni udział w corocznym szkoleniu zewnętrznym dot. oferowanych testów dla jednej osoby .	